

Para adultos con diabetes de tipo 2

SE HA DEMOSTRADO QUE OZEMPIC® REDUCE LOS NIVELES DE AZÚCAR EN LA SANGRE Y DE A1C



Imagen de actriz.

¿Qué es Ozempic®?

Ozempic® (semaglutide) inyección de 0.5 o 1 mg es un medicamento inyectable de venta con receta que se usa:

- conjuntamente con dieta y ejercicio, para mejorar el nivel de azúcar en la sangre en adultos con diabetes de tipo 2.
- para reducir el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores como infarto de miocardio, ACV o muerte en adultos con diabetes de tipo 2 y con cardiopatía conocida.

Se desconoce si Ozempic® se puede usar en pacientes que tuvieron pancreatitis.

Ozempic® no es un sustituto de la insulina y no es para usar en personas con diabetes de tipo 1 ni en personas con cetoacidosis diabética.

Se desconoce si Ozempic® es seguro y eficaz en menores de 18 años.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan

https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
<https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide inyección 0.5mg | 1mg

Control del nivel de azúcar en la sangre con Ozempic®

Hay mucho que hacer para controlar la diabetes de tipo 2... como permanecer activo, comer correctamente, tomar los medicamentos. Por eso puede ser frustrante cuando, a pesar de todo, no cumple las metas de su tratamiento.

Si no cumple sus metas en cuanto al nivel de azúcar en la sangre, la administración de Ozempic® sin insulina una vez por semana puede ayudar.



Ozempic® administrado una vez por semana ha demostrado reducir significativamente el nivel de azúcar en la sangre.

Información importante sobre la seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Ozempic®?

Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Informe a su proveedor de atención médica si encuentra un bulto o hinchazón en el cuello, o si tiene ronquera, dificultad para tragar o falta de aliento. Podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios realizados con roedores, Ozempic® y otros medicamentos que actúan como Ozempic® causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. No se sabe si Ozempic® causará tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan

https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



Imagen de actor.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Ozempic®? (cont.)

- No use Ozempic® si usted o algún miembro de su familia ha tenido CMT o si tiene una afección del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 (NEM 2).

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Alcance su meta de A1C con Ozempic®

La Asociación Americana de Diabetes (American Diabetes Association, ADA) recomienda como meta razonable para la mayoría de los adultos con diabetes de tipo 2 un nivel de A1C menor del 7 %. Su proveedor de atención médica puede indicarle cuál es la meta adecuada para usted.

Alcanzar su meta de A1C es posible con Ozempic®.



La mayoría de los adultos que usan Ozempic® alcanzaron un nivel de A1C inferior al 7 % y lograron mantenerlo.^a

En un estudio de un año de duración que se llevó a cabo con adultos con un promedio inicial de A1C del 8.1 % que alcanzaron un nivel de A1C inferior al 7 %:

- el 66 % de las personas se administraba 0.5 mg de Ozempic®
- el 73 % de las personas se administraba 1 mg de Ozempic®
- el 40 % de las personas se administraba 100 mg de Januvia®

^aResultados obtenidos de un extenso estudio de un año de duración que se llevó a cabo con 1231 adultos cuando se añadió Ozempic® una vez por semana o Januvia® una vez al día a una o más pastillas para la diabetes.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



Imagen de actriz.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

No use Ozempic® si:

- usted o algún miembro de su familia ha tenido CMT o si tiene NEM 2.
- si es alérgico a semaglutide o a cualquiera de los ingredientes de Ozempic®.

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Ozempic® puede ayudarle a adelgazar

Ozempic® es un medicamento para adultos con diabetes de tipo 2 que junto con dieta y ejercicio puede mejorar el nivel de azúcar en la sangre.

Si bien no está destinado a eso, Ozempic® puede ayudarle a adelgazar.



Los adultos que usaron Ozempic® perdieron, aproximadamente, hasta 12 libras.^a

En un estudio de un año de duración, los adultos con un peso inicial aproximado de 197 libras perdieron aproximadamente:

- 9 libras con la administración de 0.5 mg de Ozempic®
- 12 libras con la administración de 1 mg de Ozempic®
- 4 libras con la administración de 100 mg de Januvia®

Información importante sobre la seguridad (cont.)

Antes de usar Ozempic®, informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna otra afección médica, incluso lo siguiente:

- tiene o ha tenido problemas de páncreas o riñones.
- tiene antecedentes de retinopatía diabética.
- está embarazada o amamantando o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si Ozempic® les hace daño a los bebés en gestación o si pasa a la leche materna. Debe dejar de usar Ozempic® 2 meses antes de planear quedar embarazada.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



^aResultados obtenidos de un extenso estudio de un año de duración que se llevó a cabo con 1231 adultos cuando se añadió Ozempic® una vez por semana o Januvia® una vez al día a una o más pastillas para la diabetes. Aunque muchas personas que participaron en este estudio médico adelgazaron, algunas aumentaron de peso.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que use, incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas, los suplementos a base de hierbas y otros medicamentos para tratar la diabetes, como insulina o sulfonilureas.

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Menor riesgo cardiovascular con Ozempic®

Ozempic® es un medicamento que se administra una vez por semana y que se utiliza para mejorar el nivel de azúcar en la sangre y para reducir el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores como infarto de miocardio, ACV o muerte en adultos con diabetes de tipo 2 y con cardiopatía conocida.

La diabetes de tipo 2 puede aumentar el riesgo de sufrir algunos eventos cardiovasculares. Si también tiene alguna enfermedad cardíaca conocida, Ozempic® puede ayudarle a disminuir el riesgo.



En adultos con diabetes de tipo 2 que tienen enfermedades cardíacas conocidas, Ozempic® disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares mayores como infarto de miocardio, ACV o muerte.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®?

Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deje de usar Ozempic® y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Puede sentir el dolor desde el abdomen hacia la espalda.
- **cambios en la vista.** Informe a su proveedor de atención médica si nota algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic®.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (cont.)

Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos: (cont.)

- **nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Su riesgo de que le baje el azúcar en la sangre puede ser mayor si usa Ozempic® junto con otro medicamento que pueda hacer que le baje el azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. **Algunos de los síntomas y signos de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden ser:** mareo o leve aturdimiento, visión borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblor, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos rápidos y agitación.

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Ozempic® de administración una vez por semana viene en una pluma

Ozempic® puede administrarse con o sin alimentos. Adminístrese Ozempic® una vez por semana, el mismo día cada semana y exactamente como le haya indicado su proveedor de atención médica. Algunas personas eligen un día de la semana que les ayuda a recordar administrarse Ozempic® el mismo día cada semana.

Ozempic® se administra una vez por semana para ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre.

1

Una sola dosis de Ozempic® actúa día y noche, durante toda la semana.

En un estudio en el que se usó la misma pluma, más del 98 % de las personas afirmaron que aprender a usar este tipo de pluma es sencillo.^a

^a Según un cuestionario específico del dispositivo completado por pacientes con diabetes de tipo 2 a las 12 y 26 semanas a fin de evaluar la facilidad de uso y la recomendación de una pluma de Novo Nordisk muy utilizada.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



La pluma que se muestra administra dosis de 0.25 mg y de 0.5 mg.

Ozempic® también está disponible en plumas de 1 mg si su proveedor de atención médica determina que necesita mayor control del nivel de azúcar en la sangre.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

No comparta su pluma de Ozempic® con otras personas, aunque se haya cambiado la aguja. Puede contagiar una infección grave a otra persona o se la pueden contagiar a usted.

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Cómo actúa Ozempic® para reducir el nivel de azúcar en la sangre y de A1C

Ozempic® sin insulina actúa junto con la propia capacidad del cuerpo para reducir el azúcar en la sangre y la A1C. Ayuda a que el cuerpo produzca su propia insulina.

Cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, Ozempic® actúa de tres maneras en el cuerpo para ayudar a reducirlo:



Retarda la salida de los alimentos del **estómago**.



Ayuda a evitar que el **hígado** produzca demasiada azúcar.



Ayuda a que el **páncreas** produzca más insulina cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (cont.)

Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos: (cont.)

- **problemas renales (insuficiencia renal)**. En personas con problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede empeorar los problemas renales. Es importante que beba líquidos para disminuir la probabilidad de deshidratarse.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan

https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>

ESTÓMAGO
HÍGADO
PÁNCREAS

Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (cont.)

Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos: (cont.)

- **reacciones alérgicas graves**. Deje de usar Ozempic® y procure atención médica de inmediato si tiene cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como picazón, sarpullido o dificultad para respirar.

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Apoyo con Ozempic®

Con Ozempic®, usted tendrá acceso al programa de apoyo My Type 2 Transformation (Transformación de mi diabetes de tipo 2), que ofrece videos, herramientas y recursos para ayudarle a cambiar la manera en la que controla su diabetes de tipo 2. Para ver estos recursos y más herramientas, visite [MyType2Transformation.com](https://www.novo-pi.com/ozempic) (disponible solo en inglés).

El apoyo que necesita, cuando lo necesita.



Manténgase activo

Trabaje con el famoso entrenador Dolvett Quince en ejercicios diseñados exclusivamente para adultos con diabetes de tipo 2.



Póngase a cocinar

Aprenda a preparar comidas deliciosas y adecuadas para la diabetes de tipo 2 con el famoso chef Franklin Becker.



Mantenga el rumbo


Obtenga consejos para lidiar con los contratiempos y manténgase motivado con la consejera de vida Marlene Boas.

Para ver estos recursos y más herramientas, visite

**MY TYPE 2
TRANSFORMATION.com**

(disponible solo en inglés)

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



Franklin Becker

Dolvett Quince

Marlene Boas

Representantes contratados
por Novo Nordisk.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

Los efectos secundarios más comunes de Ozempic® pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Apoyo con Ozempic®

Tenga su propio Instructor de Salud en Diabetes para que le brinde apoyo personalizado en vivo.

 Línea para hablar en vivo con un Instructor de Salud en Diabetes

Llame al 1-866-696-4090 de lunes a viernes, de 9:00 AM a 6:00 PM, hora del este.



Ahorre con Ozempic®

Si aún no ha surtido su receta, hágalo de inmediato y utilice su tarjeta de ahorros de Ozempic® en [ApoyoparaOzempic.com](https://www.novo-pi.com/ozempic)

Con la tarjeta de ahorros de Ozempic®, los pacientes elegibles pagan tan solo \$25^a para un suministro de un mes o de tres meses:

- Oferta válida hasta 24 meses a partir de la fecha de activación, sujeta a un ahorro máximo de \$150 para un suministro de un mes o de \$450 para un suministro de tres meses.

^aSe aplica a los pacientes elegibles con cobertura de seguro comercial para recibir Ozempic®. El mes se establece en 28 días. Se aplican restricciones de elegibilidad y de otro tipo. Visite [ApoyoparaOzempic.com](https://www.novo-pi.com/ozempic) para ver los detalles completos del programa y los requisitos de elegibilidad.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



Notas

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Preguntas para el profesional de atención médica

- ¿Cuáles son mis metas en cuanto al nivel de azúcar en la sangre y de A1C?
- ¿Ozempic® es adecuado para mí?
- ¿Cómo debo administrarme Ozempic®?
- ¿Qué puedo esperar cuando comience a usar Ozempic®?
- ¿Cómo actúa Ozempic® para reducir el nivel de azúcar en la sangre y de A1C?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Ozempic®?
- ¿Ozempic® afecta mi riesgo cardiovascular?

Información importante sobre la seguridad (cont.)

No use Ozempic® si:

- usted o algún miembro de su familia ha tenido CMT o si tiene NEM 2.
- si es alérgico a semaglutide o a cualquiera de los ingredientes de Ozempic®.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o <https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>



Imagen de actor.

Notas

UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Obtenga Ozempic® por tan solo \$25 por receta



Con la tarjeta de ahorros de Ozempic®, los pacientes con cobertura de seguro comercial pueden pagar tan solo \$25 para un suministro de un mes o de tres meses.

- Para recibir esta oferta, la receta debe ser para un suministro de un mes o de tres meses.
- Se aplica a los pacientes elegibles con cobertura de seguro comercial para recibir Ozempic®. El mes se establece en 28 días. Sujeta a un ahorro máximo de \$150 para un suministro de un mes o de \$450 para un suministro de tres meses. Para ver la información completa del programa y los requisitos de elegibilidad, visite ApoyoparaOzempic.com

Consulte con su proveedor de atención médica durante su visita programada para hoy cómo usar Ozempic® una vez por semana

Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción que se adjuntan

https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
<https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf>

Ozempic® es de venta exclusiva con receta.

Se recomienda que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) sobre los efectos secundarios adversos de cualquier fármaco de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.



Partnership for
Prescription Assistance

Si necesita ayuda con los costos de la receta, es posible obtener asistencia. Visite pparx.org o llame al 1-888-4PPA-NOW.



UNA VEZ POR SEMANA
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg | 1mg

Ozempic® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Todas las demás marcas comerciales, registradas o sin registrar, son propiedad de sus respectivos titulares.

© 2020 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. US2002M00623 Noviembre de 2020