

ONCE-DAILY
OZEMPIC[®]
semaglutide tablets 4 mg, 9 mg



Los frascos no son del tamaño real.

Te damos la bienvenida a la pastilla de Ozempic[®]

Haz [clic aquí](#) para obtener más información sobre la pastilla de Ozempic[®].

Podrías pagar **\$25** por una receta de tan sólo hasta 3 meses.^a

Envía un mensaje de texto con la palabra **BEGIN** al **21848**^b (disponible sólo en inglés). Continúa para más información.

^aSólo para pacientes con seguro comercial. Se aplican requisitos de elegibilidad y otras restricciones.

^bPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares. Consulta los [Términos y condiciones de uso](#) (disponibles sólo en inglés).

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Cómo empezar con Ozempic®

Dosificación de la pastilla de Ozempic®



Comienzo

1.5 mg

Día 1 al 30

La dosis inicial es de 1.5 mg durante los primeros 30 días para ayudar a que tu cuerpo se acostumbre al medicamento.



Paso siguiente

4 mg

Día 31 al 60

Después de que se te acaben las pastillas de 1.5 mg, te recetarán la dosis de 4 mg para ayudar a bajar tu nivel de azúcar en la sangre.



Aumentar a una dosis más alta

9 mg

Día 61 o más adelante

Después de tomar la dosis de 4 mg al menos durante 30 días, tu médico podría recetarte la dosis de 9 mg si necesitas un mayor control del nivel de azúcar en la sangre.

Las pastillas y los frascos no son del tamaño real.

¿Qué son Ozempic® tablets?

Ozempic® (semaglutide) tablets 4 mg or 9 mg es un medicamento de venta con receta usado:

- Junto con dieta y ejercicio para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2.
- Para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios como infarto, ataque cerebral o muerte en adultos con diabetes tipo 2 que tienen un alto riesgo de estos eventos.

Se desconoce si el uso de Ozempic® tablets es seguro y eficaz en niños.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Ozempic® tablets?

Ozempic® tablets podrían causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Dile a tu médico si te sale un bulto o tienes hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o te falta el aire. Estos podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, Ozempic® tablets y otros medicamentos que actúan como Ozempic® tablets causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. Se desconoce si Ozempic® tablets causarán tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.

No tomes Ozempic® tablets si:

- Tú o un familiar ha tenido CMT o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).
- Has tenido una reacción alérgica grave al semaglutide o a cualquiera de los ingredientes de Ozempic® tablets.

Antes de tomar Ozempic® tablets, informa a tu médico si tienes alguna otra afección, incluso si:

- Tienes o has tenido problemas de páncreas o riñones.
- Tienes antecedentes de problemas en la vista relacionados con tu diabetes.
- Tienes programada una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si Ozempic® tablets podrían dañar a tu bebé en gestación. Debes dejar de usar Ozempic® tablets 2 meses antes de planear quedar embarazada.
- Estás amamantando o planeas amamantar. No se recomienda amamantar durante el tratamiento con Ozempic® tablets.

ONCE-DAILY
OZEMPIC®
semaglutide tablets 4mg, 9mg

Cómo tomar la pastilla de Ozempic®

Toma sólo una pastilla cada mañana exactamente como te indique tu médico.



Toma

Toma la pastilla al despertar, a primera hora de la mañana, en ayunas y con un sorbo pequeño de agua (hasta 4 onzas).



Ponte en marcha

Comienza tu mañana. Espera al menos 30 minutos antes de comer, beber o tomar otros medicamentos orales.

Si olvidas una dosis, la dosis olvidada se debe omitir y la próxima dosis se debe tomar al día siguiente.

Consideraciones adicionales: No tomes la pastilla de Ozempic® con ningún otro líquido que no sea agua. No partas, tritures, mastiques ni disuelvas la pastilla de Ozempic®.

Información importante de seguridad

Informa a tu médico sobre todos los medicamentos que usas, tanto de venta con receta como de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. Ozempic® tablets podrían afectar la manera en que funcionan algunos medicamentos, y algunos medicamentos podrían afectar la manera en que Ozempic® tablets funcionan.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic® tablets?

Ozempic® tablets podrían causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deja de tomar Ozempic® tablets y llama a tu médico de inmediato si tienes un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin náuseas o vómitos. A veces podrías sentir el dolor desde el abdomen hacia la espalda.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Cómo guardar la pastilla de Ozempic®



- Mantén las pastillas a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).
- Guarda las pastillas en el frasco cerrado de la pastilla de Ozempic® en un lugar seco y lejos de la humedad. No es recomendable que guardes las pastillas de Ozempic® en el baño si este se calienta demasiado o se llena de vapor.
- Mantén la tapa [azul] en el frasco de la pastilla de Ozempic® para proteger las pastillas.
- No uses un organizador de pastillas ni ningún otro contenedor para guardar la pastilla de Ozempic®.
- Mantenlas fuera del alcance de los niños.

El frasco que se muestra es para la dosis de 9 mg. También están disponibles los frascos de 1.5 mg y 4 mg. El frasco no es del tamaño real.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic® tablets? (Cont.)

- **Cambios en la vista.** Informa a tu médico si notas algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic® tablets.
- **Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Tu riesgo de que te baje el nivel de azúcar en la sangre podría ser mayor si tomas Ozempic® tablets junto con otro medicamento que pueda hacer que te baje el nivel de azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. **Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre podrían incluir:** mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación.

ONCE-DAILY
OZEMPIC®
semaglutide tablets 4mg, 9mg

Efectos secundarios más comunes de la pastilla de Ozempic®

Los efectos secundarios más comunes de la pastilla de Ozempic® podrían incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal), disminución del apetito y estreñimiento. Las náuseas, los vómitos y la diarrea son más comunes al comenzar a tomar la pastilla de Ozempic® por primera vez y cuando aumenta la dosis.

Informa a tu médico de inmediato si tienes cualquier efecto secundario que te cause molestia o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Ozempic® tablets.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic® tablets? (Cont.)

- **Deshidratación que conduce a problemas renales.** La diarrea, las náuseas y los vómitos podrían provocar pérdida de líquidos (deshidratación), lo cual podría causar problemas en los riñones. Es importante que bebas líquidos para ayudar a reducir las probabilidades de deshidratación. Informa a tu médico de inmediato si tienes náuseas, vómitos o diarrea que no desaparecen.
- **Problemas estomacales graves.** Se han reportado problemas de estómago, a veces graves, en personas que toman Ozempic® tablets. Informa a tu médico si tienes problemas estomacales que son graves o que no desaparecen.
- **Reacciones alérgicas graves.** Deja de tomar Ozempic® tablets y solicita atención médica de inmediato si tienes cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de tu cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón graves; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.

4 Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Haz [clic aquí](#) para obtener información útil adicional sobre los posibles efectos secundarios de Ozempic®.

Visita espanol.Ozempic.com para conocer más



¿Tienes preguntas acerca de Ozempic®?

Llama al 1-866-696-4090 y presiona 8 para obtener apoyo en vivo en español.



Text2Connect

Recibe acceso a Text2Connect. Un programa de apoyo basado en mensajes de texto que te ofrece recordatorios, inspiración y recursos. Envía un mensaje de texto con la palabra **BEGIN** al **21848** para empezar (disponible sólo en inglés).^a



Recibe tu medicamento de Ozempic® a través de NovoCare® Pharmacy

Recibe tu entrega directamente a través de NovoCare® Pharmacy. Tu fuente confiable para obtener Ozempic® auténtico (disponible sólo en inglés).

^aPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares. Consulta los [Términos y condiciones de uso](#).

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic® tablets? (Cont.)

- **Problemas de la vesícula biliar.** Algunas personas que toman Ozempic® tablets han tenido problemas de vesícula biliar. Informa a tu médico de inmediato si tienes síntomas de problemas de la vesícula biliar que podrían incluir: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia), fiebre o heces de color arcilla.
- **La entrada de alimentos o líquidos a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).** Ozempic® tablets podrían aumentar la posibilidad de que los alimentos entren a tus pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Informa a todos tus médicos que estás tomando Ozempic® tablets antes de programar someterte a una cirugía u otros procedimientos.

Los efectos secundarios más comunes de Ozempic® tablets podrían incluir náuseas, dolor de estómago (abdominal), diarrea, disminución del apetito, vómitos y estreñimiento.

ONCE-DAILY
OZEMPIC®
semaglutide tablets 4mg, 9mg

Ahorros en la pastilla de Ozempic®

Ofertas de ahorro de Ozempic®

Con seguro comercial
paga tan sólo

\$25

por una receta de
hasta 3 meses^a



Sin seguro o pagando por
cuenta propia, consulta las

**OFERTAS
DE AHORRO**

disponibles en
AhorraConOzempic.com^b

OZEMPIC®
semaglutide tablets 4mg/5mg

Haz clic para visitar AhorraConOzempic.com o envía un mensaje de texto con la palabra **BEGIN** al **21848** para empezar con tu oferta de ahorros (disponible sólo en inglés).^c

^aPaga tan sólo \$25, sujeto a un ahorro máximo de \$100 al mes. Se aplican requisitos de elegibilidad y otras restricciones. Un mes se define como 1 frasco de la pastilla de Ozempic® con 30 tablets. Novo Nordisk se reserva el derecho de modificar o cancelar este programa en cualquier momento. Consulta todos los términos en www.savingscardeligibility.com y NovoCarePharmacyTerms.com (disponibles sólo en inglés).

^bSe aplican requisitos de elegibilidad y restricciones. Consulta los Términos de uso en sólo en www.savingscardeligibility.com y NovoCarePharmacyTerms.com (disponibles sólo en inglés).

^cPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares. Consulta los [Términos y condiciones de uso](#) (disponibles sólo en inglés).

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Sólo Novo Nordisk fabrica medicamentos de semaglutide aprobados por la FDA, como Ozempic®.

Ozempic® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

© 2026 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. US26OZMT00095 julio de 2026



ONCE-DAILY
OZEMPIC®
semaglutide tablets 4mg, 9mg