

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg



Pacientes reales y representado por actores.

Cómo empezar a usar Ozempic®

Aquí encontrarás:



Cómo usar
tu pluma



Información
de apoyo



Cómo ahorrar
en Ozempic®

Podrías pagar tan sólo [\$25] por una receta de hasta [3 meses].^a Envía un mensaje de texto con la palabra **BEGIN** al **21848** (disponible sólo en inglés).^b

Para hacerlo por teléfono en español, llama al 1-877-304-6852 (presiona 1). Continúa para más información.

^aSólo para pacientes con seguro comercial. Se aplican requisitos de elegibilidad y otras restricciones.

^bPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos.

Descubre más en espanol.Ozempic.com

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Cómo empezar a usar Ozempic®

Al agregar Ozempic® una vez a la semana a tu plan de manejo de la diabetes tipo 2, tú y tu médico han dado un paso importante para ayudar a bajar tu nivel de azúcar en la sangre.



¿Tienes preguntas acerca de Ozempic®?

- Haz clic para ver las [preguntas frecuentes](#).
- Envía la palabra BEGIN al 21848 para inscribirte en un programa gratis de ahorros y apoyo por mensaje de texto (disponible sólo en inglés).^a
- Llama al [1-866-696-4090 y presiona 8] para recibir más respuestas.

^aPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares. Consulta los Términos y condiciones de uso en www.savingscardeligibility.com y NovoCarePharmacyTerms.com (disponibles sólo en inglés).

¿Qué es Ozempic®?

Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg, 1 mg, or 2 mg es un medicamento inyectable de venta con receta usado:

- Junto con dieta y ejercicio para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2.
- Para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios como infarto, ataque cerebral o muerte en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas confirmadas.
- Para reducir el riesgo de que se agrave la enfermedad renal, la insuficiencia renal (fase final de la enfermedad renal) y la muerte por enfermedad cardiovascular en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica.

Se desconoce si el uso de Ozempic® es seguro y eficaz en niños.

Información importante de seguridad

No compartas tu pluma de Ozempic® con otras personas, aunque se haya cambiado la aguja. Podrías contagiar una infección grave a otra persona o te la podrían contagiar a ti.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg



María, dueña de un salón de belleza, es una paciente real que usa Ozempic® para su diabetes tipo 2, y es una portavoz recompensada por Novo Nordisk.

Información importante de seguridad

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Ozempic®?

Ozempic® podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Dile a tu médico si te sale un bulto o tienes hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o te falta el aire. Estos podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, Ozempic® y otros medicamentos que actúan como Ozempic® causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. Se desconoce si Ozempic® causará tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

Cómo usar Ozempic®

Este es el calendario de dosificación de la pluma de Ozempic® que proporciona dosis de 0.25 mg o 0.5 mg:

Pluma de Ozempic®

AL COMIENZO



**LAS PRIMERAS
4 SEMANAS**

La dosis inicial es de **0.25 mg** durante las primeras **4 semanas**. Esto ayudará a que tu cuerpo se acostumbre al medicamento.



MANTENIMIENTO



**A PARTIR DE
LA SEMANA 5**

En la **semana 5**, la dosis se debe aumentar a **0.5 mg**.

¿Olvidaste usar una dosis?

Administra la dosis olvidada lo antes posible, dentro de los 5 días desde la dosis que olvidaste. Si han pasado más de 5 días, omite la dosis olvidada y usa tu próxima dosis el día que hayas programado regularmente.

Ozempic® también está disponible en plumas que administran 1 mg o 2 mg si tu médico determina que necesitas un control adicional del nivel de azúcar en la sangre.

Información importante de seguridad

No uses Ozempic® si:

- Tú o un familiar ha tenido CMT o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).
- Has tenido una reacción alérgica grave al semaglutide o a cualquiera de los ingredientes de Ozempic®.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

1

Usa Ozempic® una vez a la semana, el mismo día cada semana, exactamente como te lo recetó tu médico.



Puedes usar Ozempic® con o sin comida.



Puedes cambiar el día de la semana en que usas Ozempic® siempre que te hayas administrado tu última dosis al menos 2 días antes.

¿Cómo debería usar Ozempic®?

- Ozempic® se inyecta bajo la piel (vía subcutánea) en el abdomen, el muslo o la parte superior del brazo. **No** inyectes Ozempic® en un músculo (vía intramuscular) ni en una vena (vía intravenosa).
- **No** mezcles insulina y Ozempic® en la misma inyección.
- Cambia (alterna) el sitio de inyección en cada inyección. **No** uses el mismo sitio en cada inyección.
- Habla con tu médico sobre cómo prevenir, reconocer y manejar el nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia), el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) y los problemas relacionados con tu diabetes.

Información importante de seguridad

Antes de usar Ozempic®, informa a tu médico si tienes alguna otra afección, incluso si:

- Tienes o has tenido problemas de páncreas.
- Tienes antecedentes de problemas en la vista relacionados con tu diabetes.
- Tienes problemas graves de estómago como vaciado lento del estómago (gastroparesia) o problemas para digerir los alimentos.
- Tienes programada una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

¿Cómo uso mi pluma de Ozempic®?

Esta es una guía rápida.

Lee las Instrucciones de uso y la Información importante de seguridad antes de usar la pluma.



Prepara tu pluma


Revisa tu pluma de Ozempic®

Lee la etiqueta para verificar que tu pluma contiene Ozempic®. Asegúrate de que el medicamento Ozempic® en tu pluma sea claro e incoloro.



Coloca una aguja nueva

Toma una aguja nueva. Retira la pestaña de papel. Empuja y gira la aguja hasta que esté bien ajustada. La aguja está cubierta por dos tapas. Quita las dos tapas.



Verifica el flujo de Ozempic® con cada nueva pluma

Gira el selector de dosis hasta que el contador de dosis muestre el símbolo de verificación del flujo (●● ▴). Presiona y mantén presionado el botón de dosis hasta que el contador de dosis muestre 0. Asegúrate de que aparezca una gota en la punta de la aguja.

Envía un mensaje de texto con la palabra **PLUMA al 43967 para ver un video de demostración.^a**

^aPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

4



Adminístrate tu inyección

Selecciona tu dosis

Gira el selector de dosis hasta que el contador muestre la dosis que necesitas inyectar (0.25 mg o 0.5 mg).



5



Inyéctate tu dosis

Inserta la aguja en tu piel. Presiona y mantén presionado el botón de dosis. Después de que el contador de dosis llegue a 0, cuenta lentamente hasta 6. Retira la aguja de tu piel.



6



Después de la inyección

Retira cuidadosamente la aguja y colócala en un contenedor para objetos punzocortantes. Vuelve a colocar la tapa en la pluma.

Información importante de seguridad

Antes de usar Ozempic®, informa a tu médico si tienes alguna otra afección, incluso si: (continuación)

- Estás embarazada o amamantando, o planeas quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si Ozempic® podría dañar a tu bebé en gestación o si podría pasar a la leche materna. Debes dejar de usar Ozempic® al menos 2 meses antes de planear quedar embarazada.

Informa a tu médico sobre todos los medicamentos que usas, tanto de venta con receta como de venta libre, vitaminas, suplementos de hierbas y otros medicamentos para tratar la diabetes, incluso insulina o sulfonilureas.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Efectos secundarios comunes

Los efectos secundarios más comunes de Ozempic® podrían incluir náuseas, diarrea, vómitos, dolor estomacal (abdominal) y estreñimiento.

Si experimentas náuseas, aquí hay algunos consejos generales sobre las náuseas que podrían serte útiles:



Come alimentos blandos y bajos en grasa, como galletas saladas, tostadas y arroz

Esta dieta está pensada para que la sigas sólo un par de días.



Come alimentos que contengan agua, como sopas y gelatina



Evita alimentos fritos, con mucha grasa o dulces



Evita acostarte después de comer



Sal a respirar aire fresco



Come más despacio



Toma bebidas claras o frías

Puedes informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. Habla con tu médico acerca de cualquier efecto secundario que te moleste o que no desaparezca.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC[®]
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg



Representado por actores.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®?

Ozempic® podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deja de usar Ozempic® y llama a tu médico de inmediato si tienes un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin náuseas o vómitos. A veces podrías sentir el dolor desde el abdomen hacia la espalda.
- **Cambios en la vista.** Informa a tu médico si notas algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic®.
- **Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Tu riesgo de que te baje el nivel de azúcar en la sangre podría ser mayor si usas Ozempic® junto con otro medicamento que pueda hacer que te baje el nivel de azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. **Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre podrían incluir:** mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

Cómo almacenar tu pluma de Ozempic®



La pluma que se muestra proporciona dosis de 2 mg.

Antes del primer uso



Refrigerado de 36 °F a 46 °F (2 °C a 8 °C)

Hasta la fecha de vencimiento

Después del primer uso



Temperatura ambiente de
59 °F a 86 °F (15 °C a 30 °C)

O

Refrigerado de 36 °F a 46 °F (2 °C a 8 °C)

56 días

Envía un mensaje de texto con la palabra **PLUMA** al **43967** para más información sobre cómo usar y almacenar tu pluma.^a

^aPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg



Representado por un actor.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (continuación)

- **Deshidratación que conduce a problemas renales.** La diarrea, las náuseas y los vómitos podrían provocar pérdida de líquidos (deshidratación), lo cual podría causar problemas en los riñones. Es importante que bebas líquidos para ayudar a reducir las probabilidades de deshidratación. Informa a tu médico de inmediato si tienes náuseas, vómitos o diarrea que no desaparecen.
- **Problemas estomacales graves.** Se han reportado problemas de estómago, a veces graves, en personas que usan Ozempic®. Informa a tu médico si tienes problemas estomacales que son graves o que no desaparecen.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

El apoyo que necesitas, cuando lo necesitas



Apoyo y recursos útiles de la pluma de Ozempic®

Ingresa a la página web de Ozempic® para obtener recursos útiles, herramientas, videos e información sobre ahorros, **todo en español**.



TexT2Connect

Un programa de apoyo basado en mensajes de texto que te ofrece recordatorios, inspiración y recursos para ayudarte a comenzar y seguir con Ozempic®. Envía un mensaje de texto con la palabra **BEGIN** al **21848** para empezar (disponible sólo en inglés).^a

^aPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares. Consulta los Términos y condiciones de uso en www.savingscardeligibility.com y NovoCarePharmacyTerms.com (disponibles sólo en inglés).

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (continuación)

- **Reacciones alérgicas graves.** Deja de usar Ozempic® y solicita atención médica de inmediato si tienes cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de tu cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón graves; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.
- **Problemas de la vesícula biliar.** Algunas personas que usan Ozempic® han tenido problemas de vesícula biliar. Informa a tu médico de inmediato si tienes síntomas que podrían incluir: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), fiebre, coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia) o heces de color arcilla.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

DOSIS DE HASTA 2 MG



Si se requiere un manejo adicional del nivel de azúcar en la sangre

La pluma que se muestra proporciona una dosis de 2 mg.

Ozempic® está disponible en plumas que administran dosis de 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg o 2 mg.

Para ayudarte a manejar tu nivel de azúcar en la sangre, tu médico determinará la dosis adecuada para ti.

Para las personas que también tienen enfermedad renal crónica, después de al menos 4 semanas con 0.5 mg, tu médico podría recomendar aumentar la dosis a 1 mg.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (continuación)

- La entrada de alimentos o líquidos a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda). Ozempic® podría aumentar la posibilidad de que los alimentos entren a tus pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Informa a todos tus médicos que estás usando Ozempic® antes de programar someterte a una cirugía u otros procedimientos.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

Maneras de ahorrar en Ozempic®

Ofertas de ahorro Ozempic®

Con seguro comercial paga tan sólo \$25 por una receta de hasta 3 meses^a 	Sin seguro o pagando por cuenta propia, consulta las OFERTAS DE AHORRO disponibles en espanol.Ozempic.com.^b OZEMPIC® semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg
--	--

Haz clic para visitar **AhorraConOzempic.com** o envía un mensaje de texto con la palabra **BEGIN** al **21848** para empezar con tu oferta de ahorros (disponible sólo en inglés).^c

^aLos pacientes con seguro comercial y cobertura para Ozempic® pagan tan sólo \$25. La oferta está sujeta a un ahorro máximo de \$100 al mes y es válida por hasta 48 meses. Un mes se define como 28 días. Novo Nordisk se reserva el derecho de modificar o cancelar este programa en cualquier momento. Sólo para pacientes elegibles. Consulta todos los términos en <https://www.novocare.com/eligibility/pharmacy.html> y <https://www.novocare.com/eligibility/diabetes-savings-card.html> (disponibles sólo en inglés).

^bPara pacientes sin seguro médico o que pagan por cuenta propia, las ofertas se procesarán fuera de su seguro, no se considerarán para ningún deducible ni se aplicarán a ningún límite máximo de gastos de bolsillo de ningún seguro.

^cPodrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. Consulta con tu proveedor de servicios celulares. Consulta los Términos y condiciones de uso en www.savingscardeligibility.com y NovoCarePharmacyTerms.com (disponibles sólo en inglés).

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (continuación)

Los efectos secundarios más comunes de Ozempic® podrían incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg



María tiene diabetes tipo 2 y usa Ozempic®.
Es una portavoz recompensada por Novo Nordisk.

Consulta la Información importante de
seguridad a lo largo del folleto. Haz clic
aquí para la [Información de prescripción](#)
y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg



María es una paciente real. Vive con diabetes tipo 2 y es una portavoz recompensada por Novo Nordisk.

Haz clic aquí para la información de bienvenida de Ozempic®.

Consulta la Información importante de seguridad a lo largo del folleto. Haz clic aquí para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Sólo Novo Nordisk fabrica medicamentos de semaglutide aprobados por la FDA, como Ozempic®.

Ozempic® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

© 2026 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. US26OZM00394 julio de 2026



ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg