

¿Desea aprender acerca de Ozempic®?

AQUÍ TIENE ALGUNAS PREGUNTAS QUE PUEDE HACERLE A SU MÉDICO



Representado por actores.

La diabetes cambia con el tiempo y es posible que tenga que hacer ajustes a su alimentación y a su rutina de ejercicio. Su medicamento también puede cambiar, así que use esta guía para hablar con su médico sobre sus necesidades actuales y aprenda más sobre Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg, 1 mg, or 2 mg, un medicamento inyectable de venta con receta para adultos con diabetes tipo 2.

Asegúrese de imprimir y llevar estas preguntas con usted. Podrían ayudarle a guiar su conversación para aprovechar al máximo su visita.

- ¿En qué se diferencia Ozempic® del (de los) medicamento(s) para la diabetes que estoy usando actualmente?
- ¿Reemplazaría Ozempic® al (a los) medicamento(s) que estoy usando actualmente?
- ¿Qué sucede si no me siento cómodo con las inyecciones?
- ¿Puede un medicamento, una vez por semana, manejar el nivel de azúcar en la sangre durante *toda* la semana?
- ¿Puede Ozempic® ayudarme a lograr mi objetivo de A1C?
- ¿Afectará mi peso el uso de Ozempic®?
- ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®?
- ¿Es Ozempic® adecuado para mí?

Preguntas adicionales: _____

¿Qué es Ozempic®?

Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg, 1 mg, or 2 mg es un medicamento inyectable de venta con receta usado:

- Junto con dieta y ejercicio para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2.
- Para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios como infarto, ataque cerebral o muerte en adultos con diabetes tipo 2 con enfermedades cardíacas confirmadas.

Se desconoce si Ozempic® se puede usar en personas que han tenido pancreatitis.

Ozempic® no es para usar en personas con diabetes tipo 1.

Se desconoce si el uso de Ozempic® es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.

Información importante de seguridad

No comparta su pluma de Ozempic® con otras personas, aunque se haya cambiado la aguja. Puede contagiar una infección grave a otra persona o se la pueden contagiar a usted.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Ozempic®?

Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Dígale a su médico si le sale un bulto o tiene hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o le falta el aire. Estos podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, Ozempic® y otros medicamentos que actúan como Ozempic® causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. No se sabe si Ozempic® causará tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.
- No use Ozempic® si usted o un familiar ha tenido CMT o si usted tiene una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

La información importante de seguridad continúa en la página siguiente.

Haga clic en los enlaces para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

Información importante de seguridad (continuación)

No use Ozempic[®] si:

- Usted o un familiar ha tenido CMT o si usted tiene NEM 2.
- Es alérgico a la semaglutide o a cualquiera de los ingredientes de Ozempic[®]. Vea los síntomas de una reacción alérgica grave en “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic[®]?”.

Antes de usar Ozempic[®], informe a su médico si tiene alguna otra afección médica, incluso si:

- Tiene o ha tenido problemas de páncreas o renales.
- Tiene antecedentes de retinopatía diabética.
- Tiene programada una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).
- Está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si Ozempic[®] puede dañar a su bebé en gestación o si pasa a la leche materna. Si planea quedar embarazada, debe dejar de usar Ozempic[®] 2 meses antes de quedar embarazada.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que usa, tanto de venta con receta como de venta libre, vitaminas, suplementos de hierbas y otros medicamentos para tratar la diabetes, incluso insulina y sulfonilureas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic[®]?

Ozempic[®] puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deje de usar Ozempic[®] y llame a su médico de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sienta el dolor desde el abdomen hacia la espalda.
- **Cambios en la vista.** Informe a su médico si nota algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic[®].
- **Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Su riesgo de que le baje el nivel de azúcar en la sangre puede ser mayor si usa Ozempic[®] junto con otro medicamento que pueda hacer que le baje el nivel de azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. **Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden incluir:** mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación.
- **Problemas renales (insuficiencia renal).** En las personas que tienen problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede hacer que los problemas renales empeoren. Es importante que beba líquidos para disminuir la probabilidad de deshidratarse.
- **Reacciones alérgicas graves.** Deje de usar Ozempic[®] y solicite atención médica de inmediato si tiene cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de su cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón severos; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.
- **Problemas de la vesícula biliar.** Algunas personas que toman Ozempic[®] han tenido problemas de vesícula biliar. Informe a su médico de inmediato si tiene síntomas que pueden incluir: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), fiebre, coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia), o heces de color arcilla.
- **La entrada de alimentos o líquidos a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).** Ozempic[®] podría aumentar la posibilidad de que los alimentos entren a sus pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Informe a todos sus médicos que está tomando Ozempic[®] antes de programar someterse a una cirugía u otros procedimientos.

Los efectos secundarios más comunes de Ozempic[®] pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en la página anterior.

Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Ozempic[®] es un medicamento recetado.

Se recomienda que informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados.

Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al **1-800-FDA-1088**.

Ozempic[®] es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

© 2024 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. US24OZM00264 diciembre de 2024