

Para tu visita de seguimiento:

PREGUNTAS QUE PUEDES HACERLE A TU MÉDICO



Ahora que estás usando la inyección Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg, 1 mg, or 2 mg junto con una rutina activa y una alimentación saludable para ayudar a alcanzar tus objetivos del nivel de azúcar en la sangre, es posible que tengas preguntas adicionales para tu médico.

Aquí tienes algunas sugerencias para iniciar tu conversación, que pueden ayudarte a aprovechar al máximo tu visita:

- ¿Cómo se compara mi promedio de A1C en esta visita con el de mi visita anterior?
- ¿Qué sucede si olvido una dosis?
- ¿Algún consejo para permanecer en mi rutina de tratamiento?
- ¿Será necesario cambiar mi dosis?
- ¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta?
- ¿Hay alguna forma de ahorrar en mis recetas de Ozempic®?
- ¿Cuántas veces a la semana debo hacer actividad física?
- Aparte de llevar una dieta más saludable, ¿hay algún alimento en particular que debería evitar?

Preguntas adicionales: _____

¿Qué es Ozempic®?

Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg, 1 mg, or 2 mg es un medicamento inyectable de venta con receta usado:

- Junto con dieta y ejercicio para mejorar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2.
- Para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios como infarto, ataque cerebral o muerte en adultos con diabetes tipo 2 con enfermedades cardíacas confirmadas.
- Para reducir el riesgo de que se agrave la enfermedad renal, la insuficiencia renal (fase final de la enfermedad renal) y la muerte por enfermedad cardiovascular en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica.

Se desconoce si el uso de Ozempic® es seguro y eficaz en niños.

Información importante de seguridad

No compartas tu pluma de Ozempic® con otras personas, aunque se haya cambiado la aguja. Podrías contagiar una infección grave a otra persona o te la podrían contagiar a ti.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Ozempic®?

Ozempic® podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.** Dile a tu médico si te sale un bulto o tienes hinchazón en el cuello, ronquera, dificultad para tragar o te falta el aire. Estos podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios con roedores, Ozempic® y otros medicamentos que actúan como Ozempic® causaron tumores en la tiroides, incluso cáncer de tiroides. Se desconoce si Ozempic® causará tumores en la tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides (CMT) en las personas.
- No uses Ozempic® si tú o un familiar ha tenido CMT o si tienes una enfermedad del sistema endocrino llamada síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2).

La Información importante de seguridad continúa en la página siguiente.

Haz clic en los enlaces para la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

ONCE-WEEKLY
OZEMPIC®
semaglutide injection 0.5mg, 1mg, 2mg

Información importante de seguridad (continuación)

No uses Ozempic[®] si:

- Tú o un familiar ha tenido CMT o si tienes NEM 2.
- Eres alérgico a la semaglutida o a cualquiera de los ingredientes de Ozempic[®]. Ve los síntomas de una reacción alérgica grave en “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic[®]?”.

Antes de usar Ozempic[®], informa a tu médico si tienes alguna otra afección, incluso si:

- Tienes o has tenido problemas de páncreas.
- Tienes antecedentes de retinopatía diabética.
- Tienes problemas graves de estómago como vaciado lento del estómago (gastroparesia) o problemas para digerir los alimentos.
- Tienes programada una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).
- Estás embarazada o amamantando, o planeas quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si Ozempic[®] podría dañar a tu bebé en gestación o si podría pasar a la leche materna. Debes dejar de usar Ozempic[®] al menos 2 meses antes de planear quedar embarazada.

Informa a tu médico sobre todos los medicamentos que usas, tanto de venta con receta como de venta libre, vitaminas, suplementos de hierbas y otros medicamentos para tratar la diabetes, incluso insulina y sulfonilureas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic[®]?

Ozempic[®] podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Inflamación del páncreas (pancreatitis).** Deja de usar Ozempic[®] y llama a tu médico de inmediato si tienes un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sientas el dolor desde el abdomen hacia la espalda.
- **Cambios en la vista.** Informa a tu médico si notas algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic[®].
- **Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).** Tu riesgo de que te baje el nivel de azúcar en la sangre podría ser mayor si usas Ozempic[®] junto con otro medicamento que pueda hacer que te baje el nivel de azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. **Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre podrían incluir:** mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación.
- **Deshidratación que conduce a problemas renales.** La diarrea, las náuseas y los vómitos podrían provocar pérdida de líquidos (deshidratación), lo cual podría causar problemas en los riñones. Es importante que bebas líquidos para ayudar a reducir las probabilidades de deshidratación. Informa a tu médico de inmediato si tienes náuseas, vómitos o diarrea que no desaparecen.
- **Problemas estomacales graves.** Se han reportado problemas de estómago, a veces graves, en personas que usan Ozempic[®]. Informa a tu médico si tienes problemas estomacales que son graves o que no desaparecen.
- **Reacciones alérgicas graves.** Deja de usar Ozempic[®] y solicita atención médica de inmediato si tienes cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de tu cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón graves; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.
- **Problemas de la vesícula biliar.** Algunas personas que usan Ozempic[®] han tenido problemas de vesícula biliar. Informa a tu médico de inmediato si tienes síntomas que podrían incluir: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), fiebre, coloración amarillenta de la piel o los ojos (ictericia), o heces de color arcilla.
- **La entrada de alimentos o líquidos a los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que utilizan anestesia local o anestesia general (sedación profunda).** Ozempic[®] podría aumentar la posibilidad de que los alimentos entren a tus pulmones durante una cirugía u otros procedimientos. Informa a todos tus médicos que estás usando Ozempic[®] antes de programar someterte a una cirugía u otros procedimientos.

Los efectos secundarios más comunes de Ozempic[®] podrían incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

Consulta la Información importante de seguridad adicional en la página anterior.

Haz clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#).

Ozempic[®] es un medicamento recetado.

Se recomienda que informes a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados.

Visita www.fda.gov/medwatch, o llama al 1-800-FDA-1088.

Sólo Novo Nordisk fabrica medicamentos de semaglutida aprobados por la FDA, como Ozempic[®].

Ozempic[®] es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.

© 2025 Novo Nordisk Todos los derechos reservados. US25OZM00062 marzo de 2025